



D. O. M.

DE TRACTANDIS GANGRENA
ET

SPHACELO UTERI.

T H E S E S

ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ.



MORBUS obruitur fœmina plurimis, quorum enumeratio longior, curatio difficillima. Hos omnes recensere minimè fert animus. Ab aliorum, ergo, abstinendo Historiâ, Gangrenæ Sphacelique sævitiam curationemque tentabimus exponere. Anteaquam hoc opus magnæ molis aggrediamur, quædam sunt præmittendæ annotationes Anatomicæ, quibus ducibus ire securiùs licebit.



I.

GENITALES mulierum partes externas & internas norunt Anatomici. Externas explanare facilius, ut potè extùs obijciuntur, internarum nisi ope scalpelli, indagatio impossibilis.

I I.

MONS Veneris, labia magna, commissuræ ambæ, superior altera, altera inferior; lacunæ duæ, fossa navicularis, hymen aut carunculæ mirtiformes, nimphæ, clitoris ipsiusque præputium, priores constituunt.

I I I.

VAGINA verò, uterus, tubæ Fallopiæ, ovaria, ligamenta quatuor duo teretia quorum, lata duo, internas complectuntur.

I V.

QUÆQUIDEM omnia, vasa tum sanguifera cum limpharica alluunt, nervi miro plexu corroborant: & hæc ad quæstionem habendam sufficiant.

EX CHIRURGIA.

I.

MULIEBRE pudendum Gangtênâ Sphaceloque potest corrumpi. Sæpius hoc malum vidimus in ipsum irruens uterus, quòque corruptas foeminas mors abstulit. Priùsquàm autem uterus læderetur, loca humidiora pudendi sicuti obnoxia putredini, partesque externas vitiabat & torquebat morbus ille, tandemque utero communicabatur.

I I.

HANC labem à plurimis habere ortum causis, in dubium non est. Tristitia, mæror, vigiliæ, atra bilis, humor melancolicus illam pepererunt. Aër frigidus, humiditas & liquores quorum illa scarent loca, pessima vivendi ratio, non semel calorem iis nativum extinxere. Maximo etiam in æstu post actus venereos tuberculum obortum ita accrevisse constat, ut Gangrenâ Sphaceloque vitiatum uterum mirati sint.

Causæ.

II II. IN REGNIS CHIRURGICIS

ORIENTE malo, calor minimus perſentitur, accedit ſenſim ſine ſenſu febris & horror per omnes artus, fit mutatio coloris in parte afflicta. Primo lividitas, dein nigredo tandem apparent, foetidus odor imo cadaver redolens exhalatur. Pulſatione, ſenſuque caret, proſtrata vires, cor anxium, ſtatus demum maligni, certo certius putrefactum omnino locum exhibent.

Signa
Diagnosticæ.

I V.

PſſIMA gangrena lues periculofum portendit exitum. Tempus urget & oportet ut ei maturè obſtet Chirurgus, Periculofa ſi partes externas, periculofior ſi uterus occupet: Si Sphacelus, certa & inconcuſſa mors pronunciatur.

Prognostica.

V.

AD obtinendam curationem ſiſtenda eſt putredo remediis topicis. Quæ ſi arrideant quædam verbis annuntiabimus. Abſinthium, Lupinorum decoctum, unguentumque Ægyptiacum, cum cataplaſmate è quatuor Farinis, ſæpè huic malo cum ſucceſſu opitulata ſunt. Cardiaca non malè adhibueris partes internas corroborandi gratiâ, ſed priùs fieri inciſiones oportere ſtatuimus. At his admotis remediis ſi nedum minuatur, malum augeſcat, quæ corrumpuntur

Curatio.

4

amputanda. Admittimus etiam unctionem meliusque ligaturam sensim sine sensu constringendam, cujus ope uterus ipse tolli potest absque vitæ mulieris periculo.

D'Angers *Has Theses, DEO JUVANTE, & Præside M. JOANNE LEBAS, Artium Liberalium & Chirurgiæ Magistro, tueri conabitur RENATUS CAMUS, Andegavenfis, in almd Universitate Parisiensi Liberalium Artium Magister.*

P A R I S I I S,
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

Die Veneris 23^a. Junii anno salutis 1758, à sesqui secundâ post meridiem ad septimam.

P R O A C T U P U B L I C O .
E T M A G I S T E R I I L A U R E A .

Typis Viduæ DELAGUETTE, Collegii & Academiæ Regiæ Chirurg.
Typographi, viâ San-Jacobæâ, sub signo Olivæ.